Hemşire / Sağlık Memuru – Unvan Değişikliği Denemesi 2

ASHB unvan değişikliği sınavı · 2025 resmî konu dağılımına göre 50 soru · cevap anahtarı ve açıklamalar sondadır.

1. Bebeklerde gelişimsel kalça displazisinin erken tanısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tanı ancak çocuk yürümeye başladıktan sonra konabilir.
B) Yenidoğan döneminden itibaren fizik muayene ile taranır; risk etkenleri olan bebeklerde ultrasonla değerlendirilir; bebeğin bacaklarını sıkıca bağlayarak kundaklamak risk etkenidir.
C) Kalça displazisi yalnızca erkek bebeklerde görülür.
D) Sıkı kundaklama kalça gelişimini destekler.

2. Sağlıklı bir yenidoğanın dinlenme hâlindeki normal kalp atım hızı ve solunum sayısı aralıkları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Kalp hızı 60-80/dk – Solunum 12-20/dk
B) Kalp hızı 120-160/dk – Solunum 30-60/dk
C) Kalp hızı 80-100/dk – Solunum 20-30/dk
D) Kalp hızı 180-220/dk – Solunum 70-90/dk

3. İshal olan 9 aylık bir bebekte aşağıdaki bulgulardan hangisi ağır dehidratasyonu (sıvı kaybını) düşündürmez?

A) Ön fontanelin (bıngıldak) çökük olması
B) Ağlarken gözyaşının olmaması
C) İdrar miktarının belirgin olarak azalması
D) Bebeğin her zamanki gibi oyun oynaması ve iştahla emmesi

4. Yenidoğanlarda görülen sarılıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi patolojik sarılığı düşündürür?

A) Sarılığın doğumdan sonraki 2-3. günde başlaması
B) Sarılığın ilk 24 saat içinde ortaya çıkması
C) Sarılığın 1-2 hafta içinde kendiliğinden geçmesi
D) Sarılığın yüzde başlayıp gövdeye doğru yayılması

5. Yenidoğanda ani ses veya baş pozisyonunun aniden değişmesi sonucu kolların iki yana açılıp ardından kucaklar gibi kapanmasıyla ortaya çıkan ve normalde yaklaşık 4-6. ayda kaybolan refleks hangisidir?

A) Babinski refleksi
B) Moro (irkilme) refleksi
C) Arama refleksi
D) Yakalama refleksi

**6. Okul çağındaki bir çocukta, sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonundan yaklaşık 2-3 hafta sonra eklem ağrısı ve şişliği, ateş ve kalp kapakçıklarını etkileyebilen bir tablo gelişmiştir.
Bu tablo ve önlenmesindeki temel yaklaşım hangisidir?**

A) Kızamık – KKK aşısı
B) Akut romatizmal ateş – A grubu beta hemolitik streptokok boğaz enfeksiyonunun uygun antibiyotikle tam süre tedavi edilmesi
C) Raşitizm – D vitamini
D) Boğmaca – Karma aşı

7. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı önerilerine göre bebek beslenmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk 6 ay yalnızca anne sütü verilmelidir.
B) Ek gıdalara 6. aydan itibaren başlanmalıdır.
C) Emzirme, ek gıdalarla birlikte 2 yaşına ve ötesine kadar sürdürülmelidir.
D) Kolostrum, besin değeri düşük olduğu için bebeğe verilmemeli, sağılıp atılmalıdır.

8. Ateşli (febril) havale ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) En sık 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklarda görülür.
B) Nöbet sırasında çocuk yan yatırılarak çevresindeki tehlikeli eşyalar uzaklaştırılır.
C) Nöbet sırasında dilin ısırılmasını önlemek için çocuğun ağzına kaşık veya parmak sokulmalıdır.
D) Ateşi düşürmek için ılık uygulama yapılabilir; çocuk soğuk suya sokulmaz.

9. Okul öncesi çocuklarda ev kazalarını önlemeye yönelik uygulamalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlaçlar ve temizlik malzemeleri kilitli dolaplarda, çocuğun ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
B) Elektrik prizlerine koruyucu kapak takılmalıdır.
C) Temizlik malzemeleri, kolay ulaşılabilmesi için boş su veya meşrubat şişelerine aktarılarak saklanmalıdır.
D) Pencere ve balkonlara çocuk güvenlik kilitleri takılmalıdır.

10. Diş gelişimiyle ilgili;
I. Süt dişleri genellikle 6. ay civarında, alt orta kesici dişlerle çıkmaya başlar.
II. Süt dişlerinin toplam sayısı 20'dir.
III. İlk çıkan kalıcı diş genellikle 6 yaş civarında çıkan birinci büyük azı dişidir.
IV. Süt dişleri nasılsa değişeceği için çürüdüklerinde tedavi edilmelerine gerek yoktur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

11. Hayat kurtarma zincirinin ilk halkası hangisidir?

A) Hastanede tedavi
B) Ambulans ekiplerince müdahale
C) Sağlık kuruluşuna haber verme (112'nin aranması)
D) Olay yerinde temel yaşam desteği

12. Elektrik çarpması sonucu elektrik kaynağıyla temasının sürdüğü görülen bir kazazedeye yaklaşan ilk yardımcının ilk yapması gereken uygulama hangisidir?

A) Kazazedeyi hemen elleriyle tutarak kaynaktan uzaklaştırmak
B) Kazazedeye su dökmek
C) Elektrik akımını sigortadan veya şalterden kesmek; kesilemiyorsa kuru tahta gibi yalıtkan bir malzemeyle kazazedeyi kaynaktan ayırmak
D) Kazazedeye hemen kurtarıcı soluk vermeye başlamak

13. Yemek yerken boğazına yiyecek kaçan bilinci açık bir yetişkin konuşamıyor, öksüremiyor ve nefes alamıyorsa ilk yardımcının yapması gereken uygulama hangisidir?

A) Kazazedenin ağzına parmakla körlemesine girilerek cisim çıkarılmaya çalışılır.
B) Kazazedeye su içirilir.
C) Kazazede öne eğilerek kürek kemikleri arasına 5 kez sırt vuruşu uygulanır; çıkmazsa 5 kez karın basısı (Heimlich manevrası) yapılır.
D) Kazazede hemen sırtüstü yatırılarak kalp masajına başlanır.

14. Burun kanaması olan bir kişiye yapılacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Başı geriye yatırılır ve kanın boğaza akması sağlanır.
B) Kişi oturtulup başı hafifçe öne eğilir, burun kanatları 5 dakika süreyle sıkılır; kanama durmazsa işlem tekrarlanır.
C) Burun içine pamuk sıkıca tıkanır ve kişi sırtüstü yatırılır.
D) Kişiye sık sık burnunu sümkürmesi söylenir.

15. Isı ile oluşan yanıklarda ilk yardım uygulamalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yanan bölge en az 20 dakika süreyle çeşme suyu sıcaklığında (serin) suyla soğutulur.
B) Yanık bölgedeki yüzük, bilezik gibi eşyalar şişlik oluşmadan çıkarılır.
C) Oluşan su kabarcıkları (bül) enfeksiyonu önlemek için patlatılır ve üzerine diş macunu veya yoğurt sürülür.
D) Yanık yüzeyi temiz ve nemli bir örtüyle kapatılır.

16. Bebeklerde (0-1 yaş) temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Göğüs basısına başlamadan önce 5 kurtarıcı soluk verilir.
B) Kurtarıcı soluk ağız-ağız ve burun yöntemiyle verilir.
C) Göğüs basısı iki parmakla, göğüs kemiğinin alt yarısına, göğüs ön-arka çapının üçte biri (yaklaşık 4 cm) derinlikte uygulanır.
D) Hava yolunu açmak için baş olabildiğince geriye itilir (tam hiperekstansiyon).

17. Hipotermi (vücut sıcaklığının düşmesi) gelişen bir kişiye yapılacak ilk yardım uygulamalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kişi sıcak bir ortama alınır.
B) Islak giysiler çıkarılarak kişi kuru battaniyelerle sarılır.
C) Bilinci açıksa ılık ve şekerli içecekler verilebilir.
D) Isınması için kişiye alkollü içecek verilir ve kolları-bacakları sertçe ovuşturulur.

18. Açık kırığı olan bir yaralıya yapılacak ilk yardım uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kırık bölge hareket ettirilmeden, bulunduğu pozisyonda tespit edilir.
B) Yara üzerine temiz bir örtü konarak kanama kontrol altına alınır.
C) Dışarı çıkan kemik uçları parmakla içeri itilerek yerine yerleştirilir.
D) Tespit, kırık kemiğin üstündeki ve altındaki eklemleri de içine alacak şekilde yapılır.

19. Turnike uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uzuv kopmaları gibi diğer yöntemlerle durdurulamayan ciddi kanamalarda son çare olarak uygulanır.
B) Turnike uygulama saati kazazedenin görünen bir yerine yazılır.
C) Turnike, kanayan bölgenin hemen üzerine (kalbe yakın tarafa) ve eklem üzerine uygulanmalıdır.
D) Turnike için en az 5-10 cm genişliğinde bir bez veya kemer kullanılır, ip veya tel kullanılmaz.

20. Ciddi bir kanama sonrası kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisinin görülmesi şok tablosunu düşündürmez?

A) Hızlı ve zayıf nabız
B) Soğuk, soluk ve nemli deri
C) Kan basıncında düşme
D) Yavaş ve dolgun nabız ile sıcak ve kızarık deri

21. Gebelikte nöral tüp defektlerini (spina bifida, anensefali gibi) önlemek amacıyla kullanımı önerilen besin öğesi ve kullanımın başlama zamanı hangisidir?

A) Demir – Gebeliğin son üç ayında
B) Folik asit – Gebelik planlanırken (gebelikten önce) başlanıp ilk üç ay boyunca
C) Kalsiyum – Doğumdan sonra
D) D vitamini – Yalnızca emzirme döneminde

22. Vitaminlerle ilgili;
I. A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünür ve vücutta depolanabilir.
II. Yağda çözünen vitaminlerin aşırı alımı toksik etkilere yol açabilir.
III. B grubu vitaminleri ve C vitamini suda çözünür.
IV. K vitamini eksikliğinde kanın pıhtılaşma süresi kısalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

23. Hipertansiyonu olan bir hastaya yapılacak beslenme önerileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tuz tüketimi azaltılmalıdır.
B) Sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır.
C) Hazır ve işlenmiş gıdalar (salam, sucuk, turşu, hazır çorba) sınırlandırılmalıdır.
D) Potasyumdan zengin besinlerden kaçınılmalı, tuz yerine bol miktarda soda içilmelidir.

24. Demir eksikliği anemisi olan bir hastaya beslenme danışmanlığı veren sağlık personelinin önerileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hem demiri içeren kırmızı et, tavuk ve balık tüketilmelidir.
B) Bitkisel kaynaklı demirin emilimini artırmak için öğünlerle birlikte C vitamininden zengin besinler (limon, portakal, biber) tüketilmelidir.
C) Demirin emilimini artırmak için çay ve kahve yemekle birlikte veya hemen ardından içilmelidir.
D) Demir preparatları süt ve süt ürünleriyle aynı anda alınmamalıdır.

25. Kemik sağlığı ve osteoporozun önlenmesiyle ilgili;
I. Kalsiyumun bağırsaktan emilimi için D vitamini gereklidir.
II. D vitamininin büyük bölümü güneş ışığının (UVB) etkisiyle deride sentezlenir.
III. Düzenli ağırlık taşıyan egzersizler kemik yoğunluğunu destekler.
IV. Aşırı kafein, sigara ve alkol tüketimi kemik sağlığını korur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

26. İşitme kaybı olan yaşlı bir hastayla iletişimde aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulamadır?

A) Hastanın arkasından konuşmak
B) Yüzünü hastaya dönük tutarak, dudaklarını gizlemeden, yavaş ve net konuşmak; gürültüsüz bir ortam seçmek ve gerekirse yazılı iletişim kullanmak
C) Bağırarak konuşmak
D) Hastanın yerine yakınlarıyla konuşup hastayı görmezden gelmek

27. Hasta: "Yarın ameliyata gireceğim, ya uyanamazsam diye çok korkuyorum."
Sağlık personelinin verdiği yanıtlardan hangisi empatik bir yanıttır?

A) "Korkmanıza gerek yok, bu çok basit bir ameliyat."
B) "Ben de ameliyat olmuştum, hiçbir şey olmadı."
C) "Yarınki ameliyat sizi çok endişelendiriyor; uyanamamaktan korkuyorsunuz. Bu korkunuzu biraz daha anlatmak ister misiniz?"
D) "Siz böyle düşünürseniz ameliyat kötü geçer, olumlu düşünün."

28. Kötü haber vermede kullanılan SPIKES protokolünde, hekimin hastaya "Hastalığınızla ilgili şu ana kadar size ne söylendi, siz durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sorduğu aşama hangisidir?

A) S – Ortamın hazırlanması (Setting)
B) P – Hastanın algısının değerlendirilmesi (Perception)
C) K – Bilginin verilmesi (Knowledge)
D) E – Duygulara empatiyle yanıt verme (Emotions)

29. Johari penceresine göre, bir sağlık çalışanının hastalarla konuşurken sürekli olarak sözlerini kestiğini çevresindeki herkesin bildiği, ancak kendisinin bunun farkında olmadığı davranış hangi alanda yer alır?

A) Açık alan
B) Kör alan
C) Gizli alan
D) Bilinmeyen alan

30. Türkçe bilmeyen bir hastaya bilgi verilmesi gerektiğinde sağlık çalışanının en uygun davranışı hangisidir?

A) Hastanın yanındaki çocuğu tercüman olarak kullanmak
B) Mümkünse profesyonel bir tercüman veya hastanenin tercüme hizmetinden yararlanmak; kısa ve açık cümleler kullanıp anlaşıldığını doğrulamak
C) Hastaya bilgi vermeden işlemi yapmak
D) Daha yüksek sesle ve hızlı konuşmak

31. Demansın en sık nedeni olan Alzheimer hastalığıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ani başlar ve birkaç gün içinde düzelir.
B) Sinsi başlayan ve ilerleyen bir hastalıktır; ilk ve en belirgin belirti genellikle yakın bellek kaybıdır, ilerleyen dönemlerde dil, yönelim ve günlük yaşam becerileri de bozulur.
C) Yalnızca 40 yaşından önce görülür.
D) Tedavisiyle tamamen ortadan kaldırılabilir.

32. DSM-5'e göre majör depresif bozukluk tanısı için gerekli ölçütlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Belirtilerin en az 2 gün sürmesi yeterlidir.
B) En az 2 hafta boyunca, çökkün duygudurum veya ilgi ve zevk kaybından en az biri olmak üzere en az 5 belirti bulunmalıdır.
C) Tanı için sanrı ve varsanıların bulunması zorunludur.
D) Belirtilerin en az 2 yıl sürmesi gerekir.

33. Hastalığının ilerlemiş evrede olduğu bildirilen bir hasta, "Raporlar karışmış olmalı, ben çok iyiyim, hiçbir şeyim yok" diyerek tedavi planlarını konuşmayı reddetmektedir.
Bu hastanın kullandığı savunma mekanizması hangisidir?

A) Yüceltme
B) İnkâr (yadsıma)
C) Karşıt tepki oluşturma
D) Özdeşim

34. Şizofreni belirtileriyle ilgili;
I. Varsanılar (halüsinasyonlar)
II. Sanrılar (hezeyanlar)
III. Konuşmada fakirleşme (aleji) ve duygulanımda küntleşme
IV. İstek ve motivasyon kaybı (avolisyon)
belirtilerinden hangileri "pozitif belirti" olarak sınıflandırılır?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) III ve IV
D) I, II, III ve IV

35. İntihar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bir inanıştır (mittir)?

A) İntihar düşüncesini dile getiren kişilerin risk değerlendirmesi ciddiye alınmalıdır.
B) Kişiye doğrudan intihar düşüncesi olup olmadığını sormak, intihar düşüncesini kışkırtmaz.
C) İntihar edeceğini söyleyen kişi bunu yapmaz; yalnızca ilgi çekmek ister.
D) Depresyondan çıkış döneminde enerji artışıyla intihar riski artabilir.

36. Aşağıdaki bakteri cinslerinden hangisi olumsuz koşullara dayanıklı spor (endospor) oluşturabilir ve tetanoz, botulizm gibi hastalıklara yol açan türleri içerir?

A) Clostridium
B) Streptococcus
C) Escherichia
D) Salmonella

37. Virüslerle ilgili;
I. Zorunlu hücre içi parazittirler; yalnızca canlı hücre içinde çoğalabilirler.
II. Genetik materyal olarak ya DNA ya da RNA içerirler.
III. Antibiyotikler viral enfeksiyonların tedavisinde etkilidir.
IV. Bakterilere göre çok daha küçüktürler ve ışık mikroskobuyla genellikle görülemezler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

38. Antibiyotik direncinin gelişmesini önlemeye yönelik aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?

A) Antibiyotikler yalnızca hekim önerisiyle kullanılmalıdır.
B) Antibiyotik tedavisi önerilen süre boyunca tamamlanmalıdır.
C) Soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonlarda rutin olarak antibiyotik kullanılmalıdır.
D) Hastane enfeksiyonlarını önlemek için el hijyeni ve izolasyon önlemlerine uyulmalıdır.

39. Bir hemşire taburcu eğitiminin sonunda hastaya "Evde ilaçlarınızı nasıl kullanacağınızı bana kendi cümlelerinizle anlatır mısınız?" diye sormuştur.
Hemşirenin kullandığı değerlendirme yöntemi hangisidir?

A) Öğret-geri anlat (teach-back) yöntemi
B) Kapalı uçlu soru
C) Beyin fırtınası
D) Panel

40. Malcolm Knowles'un yetişkin eğitimi (andragoji) ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetişkinler öğrenmenin neden gerekli olduğunu bilmek ister.
B) Yetişkinlerin yaşam deneyimleri öğrenmede önemli bir kaynaktır.
C) Yetişkinler konu merkezli değil, sorun ve yaşam merkezli öğrenmeye yatkındır.
D) Yetişkinler öğrenme sürecinde tamamen edilgen olmayı ve öğretmene bağımlı kalmayı tercih eder.

41. Aşağıdaki sağlık uygulamalarından hangileri koruma düzeyleriyle doğru eşleştirilmiştir?
I. Çocukluk çağı aşılaması – Birincil koruma
II. 50 yaş üstü bireylere kolon kanseri taraması yapılması – İkincil koruma
III. İnme geçirmiş bir hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanması – Üçüncül koruma
IV. Yenidoğanlarda topuk kanından fenilketonüri taraması – Birincil koruma

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

42. Dünya Sağlık Örgütü'nün el hijyeni için tanımladığı "5 endikasyon" arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Hastayla temastan önce
B) Aseptik işlemden önce
C) Vücut sıvılarıyla temas riski sonrasında
D) Hasta odasındaki televizyonu izledikten sonra

43. Bir hemşire, bası yarası riski yüksek olan yatağa bağımlı bir hasta için "Hastanın derisi taburculuğa kadar bütünlüğünü koruyacak" hedefini belirlemiş ve iki saatte bir pozisyon değiştirme girişimini kayda geçirmiştir.
Hemşirelik sürecinin hangi aşaması gerçekleştirilmiştir?

A) Tanılama (veri toplama)
B) Hemşirelik tanısı
C) Planlama
D) Değerlendirme

44. Yetişkin bir hastanın vital bulgularıyla ilgili;
I. Nabzın dakikada 54 olması bradikardidir.
II. Solunumun dakikada 28 olması takipnedir.
III. Sistolik kan basıncının 90 mmHg'nin altında olması hipotansiyon olarak değerlendirilir.
IV. Aksiller vücut sıcaklığının 37,0 °C olması hiperpireksidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

45. Bir hekim, ameliyattan önce hastaya ameliyatın amacını, risklerini, olası komplikasyonlarını, alternatif tedavi yöntemlerini ve tedavi yapılmazsa doğabilecek sonuçları anlaşılır bir dille açıklamış, hastanın sorularını yanıtlamış ve onamını almıştır.
Bu uygulama öncelikle hangi tıp etiği ilkesinin gereğidir?

A) Yararlılık
B) Zarar vermeme
C) Özerkliğe saygı
D) Adalet

46. Afet sonrası yoğun bakım yatak sayısının sınırlı olduğu bir durumda, yatakların hastaların sosyal statüsüne veya tanıdıklığına göre değil, tıbbi ihtiyaç ve tedaviden yarar görme olasılığına göre dağıtılması öncelikle hangi etik ilkenin gereğidir?

A) Özerkliğe saygı
B) Adalet
C) Sır saklama
D) Doğruluk

47. Hasta Hakları Yönetmeliği'ne göre, akıl sağlığı yerinde olan reşit bir hastanın önerilen tedaviyi reddetmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hastanın tedaviyi reddetme hakkı yoktur; tedavi zorla uygulanır.
B) Hasta, kanunen zorunlu hâller dışında tedaviyi reddedebilir veya durdurulmasını isteyebilir; bu durumda reddin doğuracağı sonuçlar hastaya açıklanır ve hastadan yazılı bir belge alınır.
C) Hasta yalnızca ailesinin onayıyla tedaviyi reddedebilir.
D) Tedaviyi reddeden hasta bir daha aynı sağlık kuruluşundan hizmet alamaz.

48. Enfeksiyon zinciri; etken, rezervuar, çıkış kapısı, bulaş yolu, giriş kapısı ve duyarlı konak halkalarından oluşur.
Sağlık çalışanlarının el hijyenine uyması ve hastalara aşı yapılması zincirin sırasıyla hangi halkalarını kırmaya yöneliktir?

A) Rezervuar – Etken
B) Bulaş yolu – Duyarlı konak
C) Çıkış kapısı – Giriş kapısı
D) Etken – Bulaş yolu

49. Viral hepatitlerin bulaş yollarıyla ilgili;
I. Hepatit A ve Hepatit E fekal-oral yolla bulaşır.
II. Hepatit B kan, cinsel temas ve anneden bebeğe (perinatal) yolla bulaşabilir.
III. Hepatit C'nin en önemli bulaş yolu kan ve kan ürünleridir.
IV. Hepatit B'ye karşı etkili bir aşı bulunmamaktadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

50. Akciğer tüberkülozunun kontrolüyle ilgili;
I. Bulaş, hasta kişinin öksürmesi ve hapşırmasıyla havaya yayılan damlacık çekirdekleri yoluyla olur.
II. Tedavide ilaçların düzenli kullanımını güvence altına almak için doğrudan gözetimli tedavi (DGT) uygulanır.
III. Tedavi birden fazla ilacın uzun süre birlikte kullanılmasını gerektirir.
IV. Belirtiler geçince ilaçlar hemen bırakılabilir; bu durum direnç gelişimine yol açmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

MemurOdak

Cevap anahtarı ve açıklamalar üyelere özel — üyelik ücretsiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği hazırlığı

Bu PDF'in tam hâli; cevap anahtarı ve madde madde açıklamalarıyla birlikte Memur Odak üyelerine ücretsizdir. Üye ol ya da giriş yap; tam PDF otomatik iner.

Ücretsiz üye ol, tam PDF'i indir →

Üyelere ücretsiz:

- 5.600+ özgün soru, madde açıklamalı çözümler
- Unvanına göre 50 soruluk deneme (şef, şube müdürü, VHKİ, memur...)
- Her Cuma 20.00 Türkiye geneli deneme ve sıralama
- Yanlışlarım listesi ve aralıklı tekrar
- Konu özetleri ve tüm PDF'lerin tam hâli

memurodak.tr